


SKRÓCONE WĘDZIDEŁKO PODJĘZYKOWE konsekwencje, rozpoznawanie



Krótkie wędzidełko podjęzykowe.

Skrócone wędzidełko podjęzykowe to najczęściej spotykana wada anatomiczna jamy ustnej. Bardzo ważne jest, aby jak najszybciej wychwycić taką nieprawidłowość, najlepiej tuż po narodzinach. Może to już zauważyć sama mama, ale najlepiej będzie jeśli dziecko obejrzy pod tym kątem lekarz.

Krótkie wędzidełko podjęzykowe powoduje następujące konsekwencje:

U noworodka i niemowlaka:

- trudności ze ssaniem piersi,
- mało efektywne ssanie,
- bolesność, przygryzanie piersi w trakcie ssania,
- brak sprawności ruchowej języka,
- spadek przyrostu masy ciała.

U dzieci starszych

- ślinienie się,
- nieprawidłowe połykanie,
- trudności z jedzeniem,
- oddychanie ustami,
- skłonność do wad zgryzu,
- wady wymowy (dotyczy nieprawidłowej wymowy głosek: t, d, n, sz, ż, cz, dż, l, r).

Jak rozpoznać za krótkie wędzidełko:

- dziecko ma trudność z wysunięciem języka na brodę lub uniesieniem go w kierunku wątku dziąsłowego,
- podczas wysuwania języka na brodę, jego czubek może przyjmować kształt sercowaty,
- ból przy wykonywanych ćwiczeniach języka.

Wędzidełka nie da się w żaden sposób rozciągnąć ani wydłużyć – trzeba je przeciąć !

Im szybciej przeprowadzony zabieg, tym lepiej. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, trwa on kilka minut i nie wymaga specjalnych przygotowań z naszej strony. Coraz częściej zabieg wykonuje się u noworodków tuż po porodzie.